

鼓膜置管手术病患须知

- 定义
- 禁忌症
- 术后注意事项

一、定义

鼓室积液由卡他性中耳炎、分泌性中耳炎、气压性中耳炎、航空性中耳炎等疾病引起。鼓室积液的引流是治疗非化脓性中耳炎的重要措施之一，常用方法为鼓室插管术。插管可经外耳道、鼓膜插内鼓室。

二、禁忌症

- （一）初患分泌性中耳炎，可先行鼓膜穿刺。
- （二）颈静脉球体瘤（鼓室型）。
- （三）严重心脏病或血液病者。

三、术后注意事项

- （一）术后依医嘱时间进食，以防发生呕吐。
- （二）若有恶心、眩晕的现象，应避免突然的移位及转身，以维护安全。
- （三）避免用力咳嗽、擤鼻子，打喷嚏时嘴巴应张开，以减轻耳咽管压力。
- （四）在耳膜通气管未移除前避免游泳及潜水，以免感染。洗澡时避免水进入留置通气管的耳朵。
- （五）耳内避免使用棉花棒及耳掏器。
- （六）耳内通气管的留置时间约 6 个月至 1 年，期间可能会自行掉出蓝色通气小管或置管耳侧疼痛不适，请及时回门诊复查。
- （七）离院后应按时服药，并门诊回诊。